

平成21年産 さやえんどう(スナップ, キヌサヤ, オランダ) 生産履歴記帳簿

( 作型 : ハウス , (露地) ) 該当する作型に○をつけましょう。

住所  
氏名

個人情報保護のため、掲載を見合わせます

【ほ場】

| ほ場字地番   | 面積   | は種日  |
|---------|------|------|
| 1 仁町屋敷工 | 0.6a | 9/15 |
| 2 仁町野原前 | 0.4a | 9/15 |

| ほ場字地番 | 面積 | は種日 |
|-------|----|-----|
| 3     | a  |     |
| 4     | a  |     |

農薬を使用する際は、必ず適正使用基準に基づき正しく使用し、使用後は生産履歴の記帳に努めましょう。

【土壌消毒】

| 農薬名   | ほ場10a当たり<br>使用量                                   | 使用時期  | 使用回数 | ケ | ネ | ハリ | セン | 萎   | 白 | 立 | 苗 | 根 | 畑 | 消毒日  | 使用量                    |
|---|---|---|------|---|---|----|----|-----|---|---|---|---|---|------|------------------------|
|   |   |   |      | ラ | キ | ガ  | テ  | (い) | 絹 | 枯 | 立 | 腐 | 地 |      |                        |
| クロールピクリン<br>ドクロール<br>ドジョウピクリン<br>クロピク80 ※注2 | ほ場<br>2~3ml/1穴<br>間隔:30cm<br>深さ:約15cm             | 土壌温度 → 処理期間<br>25~35℃ → 7~10日<br>15~25℃ → 10~15日                | 1    | ◎ | ◎ | ◎  | ◎  |     | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | 8/17 | ml/穴<br>16kg           |
| クロピクリン錠剤 ※注2                                | 1錠/穴<br>間隔:30cm                                   | 地温15℃以上の場合、<br>処理から10日以上経過<br>後、ガス抜きする。ガス抜<br>き後、播種する。          | 1    |   |   |    | ◎  |     | ◎ | ◎ |   |   |   | /    | 1錠/穴                   |
| クロピクテープ                                     | 110m/100m <sup>2</sup><br>・90cm幅で畦立<br>・深さ15cmで作溝 | 地温15℃以上の場合、<br>処理から10日以上経過<br>後、ガス抜きする。ガス抜<br>きから7日後、播種をす<br>る。 | 1    |   |   |    |    | ◎   |   |   |   | ◎ |   | /    | 110m/100m <sup>2</sup> |
| ガスタード微粒剤<br>バスアミド微粒剤                        | 20~30kg/10a                                       | 播種又は定植21日前  | 1    |   |   |    |    |     |   |   | ◎ |   | ◎ | /    | kg/10a                 |

※注1:クロールピクリンのみ  
※注2:豆類(未成熟)で登録あり  
※注3:Rは、リゾクトニア菌  
※クロールピクリン成分を含む剤は、施用後ただちにポリエチレン等で地表面を被覆する。  
※ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤は、深さ15~25cmに土壌と十分混和する。混和後ビニール等で被覆処理する。被覆しない場合には鎮圧散水してガスの蒸散を防ぐ。

【管理作業】

| 実施日  | 管理作業                   |
|------|------------------------|
| 8/15 | アズミン苦土石灰( 120kg/10a)   |
| /    | 苦土重焼燐( kg/10a)         |
| 8/8  | 堆肥(品名: 1026 600kg/10a) |
| 8/12 | 基肥(品名: キコウ 40kg/10a)   |

| 実施日   | 管理作業                     |
|-------|--------------------------|
| 12/1  | 追肥1回目(品名: NK2号 30kg/10a) |
| 12/15 | 追肥2回目(品名: " 30kg/10a)    |
| 1/10  | 追肥3回目(品名: " 30kg/10a)    |

| 実施日       | 管理作業 |
|-----------|------|
| 8/17 ~ /  | 畦立て  |
| 9/15 ~ /  | は種   |
| / ~ /     | 芯止め  |
| 11/18 ~ / | 収穫   |

注意！この記帳簿は県農薬使用の手引き等に基づき、平成20年8月13日現在において指宿市技連会で作成していますが、生産履歴記帳を推進するために作成したものであり、使用できるすべての農薬を記載したものではありません。農薬の使用に際しては、使用するもの自らの責任において、正しく使用することが法律において義務づけられています。農薬の登録変更等もあることから、ラベルや注意書きをよく読んだ上で、正しく使用してください。

# 殺菌剤

(スナッフ、キヌサヤ、オランダ)

| 農薬名               | 成分名                  | 使用量<br>希釈倍数             | 使用時期<br>(何日前まで)   | 使用回数 | うどんこ病 | 灰色かび病 | 褐斑病 | 褐紋病 | 褐斑細菌病     | 先端黄白化症 | 根腐病 | 茎腐病 | 菌核病 | 農薬散布日 |   |   |   |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|
|                   |                      |                         |                   |      |       |       |     |     |           |        |     |     |     | 1     | 2 | 3 | 4 |
| タチガレン液剤           | ヒドロキシソキサゾール          | 500~1000倍, L            | 播種後, 生育期 (1~2ヶ月後) | 3    |       |       |     |     |           |        | ◎   |     |     | /     | / | / |   |
| リゾレックス水和剤         | トルクロホスメチル            | 1000倍, K                | 7                 | 2    |       |       |     |     |           |        |     | ◎   |     | /     | / |   |   |
| Zボルドー(野菜類で登録)     | 塩基性硫酸銅               | 500倍                    | —                 | —    |       |       |     |     | ◎         |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| Zボルドー(さやえんどうで登録)  | 塩基性硫酸銅               | 1000倍                   | —                 | —    |       |       |     |     | ◎         |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| コサイドボルドー(野菜類登録)   | 水酸化第二銅               | 1,000倍                  | —                 | —    |       |       |     |     | ◎         |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| カリグリーン(野菜類で登録)    | 炭酸水素K                | 800~1000倍, a<br>800倍, a | 24時間以上            | —    | ◎     | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| ハーモメイト水溶剤(野菜類で登録) | 炭酸水素Na               | 800~1000倍, b<br>800倍, b | 24時間以上            | —    | ◎     | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| ポトキラー水和剤(野菜類登録)   | パチルスブチリス             | 1,000倍, b               | 発病前~発病初期          | —    | ◎     | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| トップジンM水和剤         | チオファネートメチル           | 2000倍                   | 24時間以上            | 3    |       | ◎     | ◎   | ◎   |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| ロブラール水和剤          | イプロジオン               | 1500倍                   | 24時間以上            | 3    |       | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| セイビアーフロアブル20      | フルジオキシニル             | 1,000倍, a               | 24時間以上            | 3    |       | ◎     |     |     |           |        |     | ◎   |     | /     | / | / | / |
| アミスター20フロアブル      | アゾキシストロピン            | 2,000倍, c               | 24時間以上            | 3    |       | ◎     |     | ◎   |           |        |     |     | ◎   | /     | / | / | / |
| サンヨール             | DBEDC                | 500倍                    | 24時間以上            | 4    | ◎     | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| サブロール乳剤           | トリホリン                | 1000倍                   | 24時間以上            | 5    | ◎     |       |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| バイレトン水和剤5         | トリアジメホン              | 2000倍                   | 24時間以上            | 4    | ◎     |       |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| ラリー水和剤            | マイクロタニル              | 4000~8000倍, b           | 24時間以上            | 3    | ◎     |       |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| イオウフロアブル(野菜類登録)   | 硫黄                   | 500~1,000倍              | —                 | —    | ◎     |       |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| 硫黄粉剤50(野菜類登録)     | 硫黄                   | 3kg/10a                 | —                 | —    | ◎     |       |     |     | ハダニにも登録あり |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| ゲッター水和剤           | シエトフェンカルブ・チオファネートメチル | 1,500倍, a               | 24時間以上            | 3    |       | ◎     |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| トリフミン水和剤          | トリフミゾール              | 3000~5000倍              | 24時間以上            | 計5   | ◎     |       |     |     |           |        |     |     |     | /     | / | / | / |
| トリフミンジェット ※       | トリフミゾール              | m                       | 24時間以上            |      |       |       |     |     |           |        |     |     |     |       | / | / | / |

(注)「使用量・希釈倍数」の欄  
a: 100~300ℓ/10a  
b: 150~300ℓ/10a  
c: 100~400ℓ/10a  
d: 150~500ℓ/10a  
k: 1ℓ以下/㎡ 土壌かん注  
L: 3ℓ以下/㎡ 土壌かん注  
m: 50g/燻煙容積400立米

※トリフミンジェットはくん煙剤なので、ハウスで密閉する場合に限る

| 除草剤 | 剤形     | 10aあたり                                    |  | 使用時期 | 使用回数                        | 適用雑草名 | 散布日 |     |     |
|-----|--------|---|--|------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|
|     |        | 薬量  | 希釈水量   |      |                             |       | 散布日 | 散布日 | 散布日 |
| 除草剤 | ハービー液剤 | 薬量: 300~500mℓ以下/10a<br>希釈水量: 100~150ℓ/10a | ・播種前又は定植前(雑草生育期 草丈20cm以下)<br>・収穫前日まで(雑草生育期 草丈20cm以下, 陸間処理) | 3回   | 畑地1年生雑草                     | /     | /   | /   |     |
|     | バスタ液剤  | 薬量: 300~500mℓ以下/10a<br>希釈水量: 100~150ℓ/10a | ・播種前又は定植前(雑草生育期)<br>・収穫前日まで(雑草生育期, 陸間処理)                   | 3回   | 畑地1年生雑草                     | /     | /   | /   |     |
|     | ナブ乳剤   | 薬量: 150~200mℓ以下/10a<br>希釈水量: 100~150ℓ/10a | 雑草生育期: イネ科雑草3~5葉期<br>但し収穫1ヶ月前まで                            | 1回   | 畑地1年生イネ科雑草<br>(スズメノカタビラを除く) | /     |     |     |     |

| 展着剤 | 成分名   | 希釈倍数・使用量       | 適用農薬名   |
|-----|-------|----------------|---------|
| 展着剤 | ベタリンA | 5,000倍~10,000倍 | 殺虫剤・殺菌剤 |

\*留意点\* 「使用回数」は、同じ成分の使用できる回数(成分名を確認)

# 殺虫剤

(スナッフ), キヌサヤ, オランダ)

| 農薬名                  | 成分名            | 使用量<br>希釈倍数            | 使用時期<br>(収穫前<br>まで) | 使用回数 | 農薬散布日 |       |              |        |       |       |       |      |        |        |      |        |       |  |   |   |   |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------------|------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|--------|------|--------|-------|--|---|---|---|
|                      |                |                        |                     |      | アブラムシ | ヨトウムシ | シロイチモ        | トウモロコシ | ハスモンヨ | エモグリバ | ナモグリバ | ザミウマ | ヒラズハナア | アザミウマ類 | ハダニ類 | モグリバクエ | ダイズクエ |  |   |   |   |
| アドマイヤー1粒剤            | イミダク<br>ロプリド   | 3kg/10a<br>(播溝土壌混和)    | 播種時                 | 1    | ◎     |       |              |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | ←豆類(未成熟, ただし, さやいんげん, 未成熟そらまめを<br>除く)で登録 |   |   |   |
| アタブロン乳剤              | ケルフルアスロン       | 2000倍, a               | 24時間以上              | 2    |       |       | ◎            |        |       |       |       |      |        |        |      |        | 10/25 | /  |   |   |   |
| カスケード乳剤              | フルフェノクスロン      | 4000倍, a               | 24時間以上              | 2    |       |       | ◎            |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  |   |   |   |
| ノーモルト乳剤              | テフルベンズロン       | 2000倍, a               | 24時間以上              | 2    |       |       | ◎            |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  |   |   |   |
| トレボン乳剤               | エトフェン<br>プロックス | 1000倍                  | 24時間以上              | 2    |       | ◎     | ◎            | ◎      | ★     |       |       |      |        |        |      |        | 11/20 | /  |   |   |   |
| トレボンEW               |                |                        |                     |      |       | ◎     | ★            | ◎      | ★     |       |       |      |        |        |      |        |       |  |   |   |   |
| アデオン乳剤               | ベルメトリン         | 3000倍                  | 24時間以上              | 3    |       | ◎     | ◎            | ★      | ★     |       | ◎     |      |        |        |      |        | 10/15 | 12/13                                    | / |   |   |
| ハチハチフロアブル            | トルフェンピラト       | 1,000~2,000倍, a        | 24時間以上              | 2    |       |       |              |        |       |       | ◎     |      |        |        |      |        | /     | /  |   |   |   |
| パダンSG水溶剤             | カルタップ          | 1500倍<br>1500~3000倍    | 24時間以上              | 3    |       | ◎     |              |        |       |       | ◎     |      |        |        |      |        | 11/5  | 11/5                                     | / |   |   |
| マブリック水和剤20           | フルバリネート        | 4000倍                  | 24時間以上              | 3    |       |       |              |        |       |       | ◎     |      |        |        |      |        | /     | /  | / |   |   |
| モスピラン水溶剤             | アセタミプリド        | 4000倍, a               | 24時間以上              | 3    | ◎     |       | コナジラミ類にも登録あり |        |       |       | ◎     |      |        |        |      | 12/14  | 1/29  | /  |   |   |   |
| スカウトフロアブル            | トラロメトリン        | 1500倍                  | 24時間以上              | 2    |       | ★     |              |        |       |       | ◎     |      |        |        |      |        | /     | /  |   |   |   |
| ニツソラン水和剤             | ヘキシチアゾクス       | 2000~3000倍             | 24時間以上              | 2    |       |       |              |        |       |       |       |      | ◎      |        |      |        | /     | /  |   |   |   |
| ゼンターリ顆粒水和剤           | BT             | 1000倍                  | 24時間以上              | 計4   |       |       | ★            | ◎      | ◎     |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  | / | / |   |
| デルフィン顆粒水和剤           |                |                        | (発生初期)              |      |       |       | ★            | ◎      | ◎     |       |       |      |        |        |      |        |       |  |   |   |   |
| サンクリスタル乳剤            | 脂肪酸グ<br>リセリド   | 300倍, d<br>300~600倍, d | 24時間以上              | -    | ◎     |       | うどんこ病にも登録あり  |        |       |       | ◎     |      |        |        |      | /      | /     | /  | / |   |   |
| アフーム乳剤               | エマメクテン         | 2000倍, a               | 3                   | 2    |       |       |              |        | ◎     | ★     |       |      |        |        |      |        | 12/26 | /  |   |   |   |
| マラソン粉剤3              | マラソン           | 3kg/10a                | 7                   | 3    | ◎     | ◎     |              |        |       | ◎     |       | ◎    | ◎      | ◎      |      |        | /     | /  | / |   |   |
| マラソン乳剤<br>(豆類未成熟で登録) |                | 2,000~3,000倍           |                     |      | ◎     |       |              |        |       |       | ◎     |      | ◎      | ◎      |      |        |       |  | / | / | / |
|                      |                | 1,000倍                 |                     |      |       |       |              |        |       |       | ◎     |      |        |        |      |        |       |  |   |   |   |
| ダニトロンフロアブル           | フェンピロキシメト      | 1000倍, b               | 7                   | 1    |       |       |              |        |       |       |       |      | ◎      |        |      |        | /     | ←豆類(未成熟, ただし, さやいんげん除く)で登録あり             |   |   |   |
| ダイアジノン乳剤40           | ダイアジノン         | 1000倍<br>1000~2000倍    | 14                  | 3    | ◎     |       |              |        |       |       |       |      | ◎      |        |      |        | /     | /  | / |   |   |
| スミチオン乳剤              | MEP            | 1000~2000倍             | 30 (※1)             | 4    | ◎     |       |              |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  | / | / |   |
|                      |                |                        |                     |      |       |       |              |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  | / |   |   |
|                      |                |                        |                     |      |       |       |              |        |       |       |       |      |        |        |      |        | /     | /  | / |   |   |

←露地のみで使用する。  
薬害が出やすいので注意。

←野菜類で登録あり

←野菜類で登録あり

(※1) ファキラー印, 金鳥, 理研  
のマラソン乳剤についてはサヤエント  
ウで登録あり21日前まで散布可

★ 適用病害虫としての登録はとれていないが, ◎の防除の際に同時に効果が見込まれるもの